

CONCOURS GÉNÉRAL DES LYCÉES

—

SESSION 2022

—

**MATHÉMATIQUES**

(Classes de terminale voie générale spécialité mathématiques)

Durée : 5 heures

—

*L'usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.  
L'usage de la calculatrice sans mémoire « type collègue » est autorisé.*

Consignes aux candidats

- Ne pas utiliser d'encre claire
- N'utiliser ni colle, ni agrafe
- Numérotter chaque page en bas à droite (numéro de page / nombre total de pages)
- Sur chaque copie, renseigner l'en-tête + l'identification du concours :

Concours / Examen : CGL

Epreuve : 101

Matière : MATH

Session : 2022

## Problème 1 : En pleine effervescence

Pour tout réel  $x \geq 0$ , on note  $E(x)$  la partie entière de  $x$ , c'est-à-dire le plus grand entier naturel inférieur ou égal à  $x$ . On a donc  $E(x) \in \mathbb{N}$  et  $E(x) \leq x < E(x) + 1$ .

Par exemple,  $E(2,4) = 2$ ,  $E(3) = 3$  et  $E(1,9) = 1$ .

On dit qu'un réel  $x$  est *pétillant* si  $x \geq 0$  et si, pour tout entier  $n \geq 1$ , le nombre  $E(x^{(2^n)}) + 2$  est le carré d'un entier.

### Partie 1 : Mise en jambes

- 1) Démontrer que le réel  $\frac{3}{2}$  n'est pas pétillant.
- 2) Démontrer que l'intervalle  $[0; 1[$  ne contient aucun réel pétillant.
- 3) a) Démontrer que, si un réel  $x$  est pétillant, alors le réel  $x^2$  est aussi pétillant.  
b) Démontrer que, s'il existe un réel pétillant, alors il existe une infinité de réels pétillants.
- 4) Démontrer qu'aucun entier naturel n'est pétillant.

Dans la suite de ce problème, on considère un entier  $k \geq 1$  fixé. On souhaite établir que l'intervalle  $[k; k+1[$  contient un unique réel pétillant. On note  $(u_n)_{n \geq 1}$  la suite définie par

$$u_1 = (k+1)^2$$

et, pour tout entier  $n \geq 1$ ,

$$u_{n+1} = (u_n - 1)^2.$$

### Partie 2 : Existence

- 5) Démontrer que  $u_n \geq 3$  pour tout entier  $n \geq 1$ .
- 6) Démontrer que, pour tout entier  $n \geq 1$ , il existe un unique réel  $a_n \geq 1$  tel que  $a_n^{(2^n)} + 2 = u_n$ , et un unique réel  $b_n \geq 1$  tel que  $b_n^{(2^n)} + 1 = u_n$ .
- 7) Démontrer que la suite  $(a_n)_{n \geq 1}$  est strictement croissante et que la suite  $(b_n)_{n \geq 1}$  est strictement décroissante.
- 8) Démontrer que la suite  $(a_n)_{n \geq 1}$  est convergente. On note  $\alpha$  sa limite.
- 9) Démontrer que  $k < \alpha < k+1$  et que  $\alpha$  est pétillant.

### Partie 3 : Unicité

Soit  $\gamma$  un réel pétillant contenu dans l'intervalle  $[k; k+1[$ .

Pour tout entier  $n \geq 1$ , on pose  $v_n = E(\gamma^{(2^n)}) + 2$ .

- 10) Démontrer que  $u_n = v_n$  pour tout entier  $n \geq 1$ .
- 11) Avec les notations de la partie 2, démontrer que, pour tout entier  $n \geq 1$ ,

$$a_n \leq \gamma \leq b_n.$$

- 12) a) Soit  $x$  et  $y$  deux réels tels que  $x \geq y \geq 1$ .

Démontrer que, pour tout entier naturel  $n \geq 1$ ,

$$x^{(2^n)} - y^{(2^n)} \geq 2^n(x - y).$$

- b) Démontrer que les suites  $(a_n)_{n \geq 1}$  et  $(b_n)_{n \geq 1}$  convergent toutes les deux vers  $\gamma$ .

- 13) Démontrer que  $\gamma$  est l'unique réel pétillant contenu dans l'intervalle  $[k; k+1]$ .

## Problème 2 : Garder le cap

Soit  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  un repère orthonormé du plan. Dans ce problème, on considère un entier  $n \geq 2$  fixé et on étudie une suite de points  $(M_k)_{k \geq 0}$  telle que  $M_0 = O$  et que, pour tout entier  $k \geq 0$ , le vecteur  $\overline{M_k M_{k+1}}$  soit égal à  $\vec{i}$  ou à  $\vec{j}$ . Le but du problème est de démontrer qu'une telle suite de points contient toujours au moins  $n$  points alignés.

**Notation :** Dans toute la suite de l'exercice, une fraction  $\frac{p}{q}$  peut aussi être désignée par  $p/q$ .

### Partie 1 : Étude des petites valeurs de $n$

- 1) Démontrer que la suite  $(M_k)_{k \geq 0}$  contient toujours deux points alignés.
- 2) Démontrer que la suite  $(M_k)_{k \geq 0}$  contient toujours trois points alignés.

### Partie 2 : Préliminaires

- 3) Démontrer qu'il existe une suite  $(u_k)_{k \geq 0}$  telle que, pour tout entier  $k \geq 0$ ,
  - ▷ le vecteur  $\overline{M_0 M_k}$  soit égal à  $u_k \vec{i} + (k - u_k) \vec{j}$ ;
  - ▷ le terme  $u_{k+1}$  soit égal à  $u_k$  ou bien à  $1 + u_k$ .
- 4) Démontrer que, si l'on dispose de deux nombres réels  $s$  et  $t$  pour lesquels il existe  $n$  entiers  $k$  tels que  $u_k = sk + t$ , la suite  $(M_k)_{k \geq 0}$  contient bien  $n$  points alignés.

Dans la suite, pour tout entier  $k \geq 1$ , on pose  $v_k = u_k/k$ .

- 5) Démontrer, pour tout entier  $k \geq 1$ , que  $v_k$  est un nombre compris entre 0 et 1.

Enfin, au cours de ce problème, il sera fréquemment utile d'invoquer le résultat connu sous le nom de *principe des tiroirs* et qui est l'objet de la question suivante.

- 6) Soit  $k$  et  $\ell$  deux entiers naturels non nuls. On veut répartir  $k\ell$  chemises parmi  $k$  tiroirs. Démontrer qu'au moins un de ces  $k$  tiroirs contiendra au moins  $\ell$  chemises.

### Partie 3 : Barrières rationnelles

Dans cette partie, on considère une fraction irréductible  $a/b$  comprise entre 0 et 1. Par conséquent,  $a$  et  $b$  sont deux entiers naturels tels que  $0 \leq a \leq b$  et  $1 \leq b$ .

- 7) Soit  $k \geq 1$  un éventuel entier tel que  $v_k \leq a/b \leq v_{k+1}$  ou  $v_{k+1} \leq a/b \leq v_k$ . Démontrer que

$$a - b \leq bu_k - ak \leq a.$$

- 8) En déduire que, s'il existe au moins  $(b+1)n$  entiers  $k$  tels que  $v_k \leq a/b \leq v_{k+1}$  ou  $v_{k+1} \leq a/b \leq v_k$ , la suite  $(M_k)_{k \geq 0}$  contient bien  $n$  points alignés.

#### Partie 4 : Couples serrés, moyennes naïves et recouvrements par des intervalles principaux

Soit  $a/b$  et  $c/d$  deux fractions irréductibles, dont les dénominateurs  $b$  et  $d$  sont strictement positifs. On dit que le couple  $(a/b; c/d)$  est serré si l'égalité  $bc - ad = 1$  est vérifiée. En outre, on appelle *moyenne naïve* des deux fractions  $a/b$  et  $c/d$  la fraction  $(a+c)/(b+d)$ . Enfin, on appelle *intervalles principaux* de la fraction  $a/b$  les deux intervalles  $\left[\frac{a}{b} - \frac{1}{2bn}; \frac{a}{b}\right]$  et  $\left[\frac{a}{b}; \frac{a}{b} + \frac{1}{2bn}\right]$ . Plus précisément, on dit que  $\left[\frac{a}{b} - \frac{1}{2bn}; \frac{a}{b}\right]$  est l'intervalle principal inférieur de  $a/b$  et que  $\left[\frac{a}{b}; \frac{a}{b} + \frac{1}{2bn}\right]$  est l'intervalle principal supérieur de  $a/b$ . De manière générale, on dira qu'un intervalle est un *intervalle principal* s'il existe une fraction irréductible dont il est un intervalle principal.

- 9) Démontrer que le couple de fractions  $(0/1; 1/1)$  est serré.
- 10) Soit  $(a/b; c/d)$  un couple de fractions serré.
  - a) Démontrer que  $a/b < c/d$ .
  - b) Soit  $x/y$  la moyenne naïve des deux fractions  $a/b$  et  $c/d$ . Démontrer que  $x/y$  est une fraction irréductible, et que les couples  $(a/b; x/y)$  et  $(x/y; c/d)$  sont tous deux serrés.
- 11) Soit  $a/b, c/d$  et  $e/f$  trois fractions irréductibles telles que les couples  $(a/b; c/d)$  et  $(c/d; e/f)$  soient serrés. Démontrer que, si  $d \geq 2n$ , la fraction  $c/d$  appartient à l'intervalle principal supérieur de la fraction  $a/b$  et à l'intervalle principal inférieur de la fraction  $e/f$ .

On considère maintenant le processus suivant.

On part d'une liste dont les deux éléments sont les fractions irréductibles  $0/1$  et  $1/1$ . Puis, tant que cette liste contient deux fractions consécutives  $a/b$  et  $c/d$  telles que  $b+d < 2n$ , on insère dans la liste, entre ces deux fractions, leur moyenne naïve  $(a+c)/(b+d)$ .

- 12) Démontrer que le processus ci-dessus finit nécessairement par s'arrêter, et qu'alors la liste obtenue contient au plus  $4n^2$  fractions, dont tout couple de fractions consécutives est un couple serré.

Soit  $0/1 = q_1 < q_2 < \dots < q_\ell = 1/1$  les  $\ell$  fractions obtenues à l'issue du processus ci-dessus. Pour tout entier  $k$  tel que  $1 \leq k \leq \ell - 1$ , on note  $r_k$  la moyenne naïve des fractions  $q_k$  et  $q_{k+1}$ .

- 13) Démontrer que les dénominateurs des fractions  $r_k$  appartiennent tous à l'intervalle  $[2n; 4n-1]$ .
- 14) Démontrer que, pour tout entier  $k$  tel que  $1 \leq k \leq \ell - 1$ , chacun des intervalles  $[q_k; r_k]$  et  $[r_k; q_{k+1}]$  est inclus dans un intervalle principal.

#### Partie 5 : Coincé dans un intervalle principal

Soit  $a/b$  une fraction irréductible. On suppose qu'il existe un entier  $\ell \geq 1$  tel que chacun des termes  $v_{\ell n}, v_{\ell n+1}, \dots, v_{2\ell n-1}$  appartient à l'intervalle  $\left[\frac{a}{b}; \frac{a}{b} + \frac{1}{2bn}\right]$ .

- 15) Démontrer que  $0 \leq bu_k - ak < \ell$  pour tout entier  $k$  tel que  $\ell n \leq k \leq 2\ell n - 1$ .

- 16) En déduire que la suite  $(M_k)_{k \geq 0}$  contient bien  $n$  points alignés.

On suppose maintenant qu'il existe un entier  $\ell \geq 1$  tel que chacun des termes  $v_{\ell n}, v_{\ell n+1}, \dots, v_{2\ell n-1}$  appartient à l'intervalle  $\left[\frac{a}{b} - \frac{1}{2bn}; \frac{a}{b}\right]$ .

- 17) Démontrer, sous ces nouvelles hypothèses, que la suite  $(M_k)_{k \geq 0}$  contient bien  $n$  points alignés.

### Partie 6 : Conclusion

- 18) a) Démontrer que la suite  $(M_k)_{k \geq 0}$  contient nécessairement  $n$  points alignés.  
b) Démontrer que  $n$  des  $n \times 2^{32n^4}$  premiers points de la suite  $(M_k)_{k \geq 0}$  sont alignés.  
*Toute réponse aboutissant à une valeur finie différente de  $n \times 2^{32n^4}$  sera prise en considération et valorisée selon la valeur proposée.*

### Partie 7 : Vers l'infini, et au-delà!

- 19) La suite  $(M_k)_{k \geq 0}$  contient-elle nécessairement une infinité de points alignés?

## Problème 3 : Un tournoi par équipes

Si  $E$  est un événement, on désigne par  $P(E)$  la probabilité de  $E$ . On pourra librement utiliser le résultat suivant : si  $D_1, \dots, D_k$  sont des événements deux à deux disjoints, alors

$$P(D_1 \cup \dots \cup D_k) = P(D_1) + \dots + P(D_k).$$

### Partie 1 : Un jeu, deux joueurs

Ambre dispose d'une pièce qui, à chaque lancer, donne PILE avec une probabilité  $a \in ]0; 1[$  et donne FACE avec une probabilité  $1 - a$ . Quant à lui, Benjamin dispose d'une pièce qui, à chaque lancer, donne PILE avec une probabilité  $b \in ]0; 1[$  et donne FACE avec une probabilité  $1 - b$ .

Ils décident de jouer au jeu suivant : chacun lance sa pièce. S'ils obtiennent tous les deux PILE ou tous les deux FACE, ils relancent chacun leur pièce et continuent ainsi tant qu'ils obtiennent simultanément PILE ou simultanément FACE. *A contrario*, ils s'arrêtent dès que l'un obtient PILE et l'autre FACE. Celui qui obtient PILE est alors déclaré gagnant. Tous les lancers sont indépendants.

Pour tout entier  $n \geq 1$ , on note  $A_n$  l'événement « Ambre gagne lors du  $n^{\text{ème}}$  lancer »,  $B_n$  l'événement « Benjamin gagne lors du  $n^{\text{ème}}$  lancer » et  $C_n$  l'événement « chacun des deux joueurs lance au moins  $n$  fois sa pièce lors de ce jeu ».

- 1) a) On pose  $\lambda = 1 - a - b + 2ab$ . Démontrer que  $P(C_2) = \lambda$ .  
b) Pour tout entier  $n \geq 1$ , exprimer  $P(C_{n+1})$  en fonction de  $P(C_n)$ . En déduire une expression de  $P(C_n)$  en fonction de  $n$ .
- 2) Soit  $n \geq 1$  un entier.
  - a) Exprimer  $P(A_n)$  en fonction de  $a$ ,  $b$  et  $P(C_n)$ .
  - b) En déduire une expression de  $P(A_n)$  en fonction de  $a$ ,  $b$  et  $n$ .
  - c) Donner une expression de  $P(B_n)$  en fonction de  $a$ ,  $b$  et  $n$ .
- 3) On note  $G_A$  l'événement « Ambre est gagnante » et  $G_B$  l'événement « Benjamin est gagnant ».
  - a) Démontrer que  $0 < \lambda < 1$ .
  - b) Démontrer, pour tout entier  $n \geq 1$ , que  $P(G_A) \geq a(1 - b) \times \frac{1 - \lambda^n}{1 - \lambda}$  et  $P(G_B) \geq b(1 - a) \times \frac{1 - \lambda^n}{1 - \lambda}$ .
  - c) On note  $G_\emptyset$  l'événement « Ce jeu n'a aucun gagnant ». Déduire de ce qui précède que

$$P(G_A) = \frac{a(1 - b)}{1 - \lambda}, \quad P(G_B) = \frac{b(1 - a)}{1 - \lambda} \quad \text{et} \quad P(G_\emptyset) = 0.$$

## Partie 2 : Qu'est-ce qu'un jeu régulier ?

Un jeu à  $N$  personnes  $A_1, A_2, \dots, A_N$  est dit *régulier* lorsqu'il possède les caractéristiques suivantes :

- > Le jeu se déroule en un ou plusieurs tours successifs. Chaque tour ne concerne que deux joueurs. Chaque personne peut jouer plusieurs tours, mais n'est pas obligée de jouer contre chacune des autres personnes.
- > À chaque tour, il ne peut y avoir qu'un seul gagnant.
- > Il existe des réels strictement positifs  $a_1, a_2, \dots, a_N$  tels que, pour toutes personnes  $A_i$  et  $A_j$ , le quotient des probabilités  $\frac{P(A_i \text{ gagne contre } A_j)}{P(A_j \text{ gagne contre } A_i)}$  soit égal à  $\frac{a_i}{a_j}$ .

4) Démontrer que le jeu suivant est régulier :

Les personnes  $A_1, A_2, \dots, A_{2022}$  disposent chacune d'une pièce. Pour tout  $i$ , à chaque lancer, la pièce de la personne  $A_i$  donne PILE avec une probabilité  $p_i \in ]0;1[$  et donne FACE avec une probabilité  $1 - p_i$ . Le jeu se déroule en un ou plusieurs tours successifs, et à chaque tour deux personnes se rencontrent et jouent selon les modalités du jeu décrit dans la Partie 1.

## Partie 3 : Un tournoi régulier par équipes

Soit  $A$  et  $B$  deux équipes. On note  $m \in \mathbb{N}^*$  l'effectif de  $A$  et  $n \in \mathbb{N}^*$  l'effectif de  $B$ . On numérote alors les membres des équipes par ordre de passage :  $A_1, A_2, \dots, A_m$  pour  $A$  et  $B_1, B_2, \dots, B_n$  pour  $B$ . Les deux équipes  $A$  et  $B$  s'affrontent lors d'un tournoi constitué de plusieurs parties successives dont les issues sont indépendantes. Lors de chaque partie, la première personne de l'équipe  $A$  joue contre la première personne de l'équipe  $B$  et, à l'issue de cette partie, une seule de ces deux personnes est déclarée gagnante et le perdant est éliminé. Le gagnant joue alors contre une nouvelle personne de l'équipe adverse et on continue ainsi jusqu'à ce qu'une équipe n'ait plus d'adversaire, gagnant ainsi le tournoi.

Par exemple, pour  $m = n = 3$ , la personne  $A_1$  joue contre la personne  $B_1$ . Si  $A_1$  gagne, alors  $B_1$  est éliminée, et  $A_1$  joue contre  $B_2$  lors de la seconde partie. Si, cette fois, c'est  $B_2$  qui gagne, alors  $A_1$  est éliminée et  $B_2$  rencontre  $A_2$  pour la partie suivante. Si  $B_2$  gagne cette nouvelle partie, alors  $A_2$  est éliminée et  $B_2$  rencontre maintenant  $A_3$ . Si  $B_2$  gagne à nouveau, alors  $A_3$  est éliminée et l'équipe  $B$  a remporté le tournoi.

On suppose de plus que l'ensemble du tournoi constitue un jeu régulier. Il existe donc des réels strictement positifs  $a_1, a_2, \dots, a_m$  et  $b_1, b_2, \dots, b_n$  tels que, pour chaque partie qui voit s'affronter les personnes  $A_i$  et  $B_j$ , on ait :

$$\frac{P(A_i \text{ gagne contre } B_j)}{P(B_j \text{ gagne contre } A_i)} = \frac{a_i}{b_j} \quad (*)$$

5) Dans cette question uniquement, on suppose que  $a_i = b_j = 1$  pour tous  $i$  et  $j$ . On note  $u_{m,n}$  la probabilité que l'équipe  $A$  gagne le tournoi.

- a) Démontrer que  $u_{m,n} + u_{n,m} = 1$ .
- b) Que vaut  $u_{n,n}$  ?
- c) Déterminer la valeur de  $u_{1,n}$  en fonction de  $n$ .
- d) Déterminer la valeur de  $u_{2,n}$  en fonction de  $n$ .

6) Dans cette question uniquement, on se place dans le cas  $m = n = 2$ . Les nombres  $a_1, a_2, b_1$  et  $b_2$  ne sont plus supposés être égaux à 1.

- a) Exprimer la probabilité que  $A_i$  gagne contre  $B_j$  en fonction de  $a_i$  et  $b_j$ .
- b) Démontrer que la probabilité que l'équipe  $A$  gagne le tournoi est égale à

$$\frac{a_1^2 a_2^2 + a_1 a_2 (a_1 + a_2)(b_1 + b_2) + (a_1^2 + a_1 a_2 + a_2^2) b_1 b_2}{(a_1 + b_1)(a_1 + b_2)(a_2 + b_1)(a_2 + b_2)}$$

Cette probabilité dépend-elle de l'ordre choisi des joueurs pour leur entrée dans le tournoi ?

### Partie 4 : Une généralisation

On conserve le tournoi régulier décrit dans la Partie 3.

Cependant, en plus des parties du tournoi, on décide de faire jouer chaque membre de l'équipe  $A$  contre chacun des membres de l'équipe  $B$  qu'il n'a pas rencontrés durant le tournoi, les parties supplémentaires satisfaisant toujours la propriété  $(\star)$ . Cela donne un total de  $mn$  parties. On code les résultats de ces parties grâce un tableau rectangulaire de  $m$  lignes et  $n$  colonnes. Dans la case située sur la ligne  $i$  et la colonne  $j$ , on place un symbole  $A$  si  $A_i$  a gagné contre  $B_j$ , et un symbole  $B$  sinon.

Dans l'exemple de tournoi présenté en début de Partie 3 avec  $m = n = 3$ , on obtiendra un tableau de la forme

$A$	$B$	?
?	$B$	?
?	$B$	?

où chacun des symboles ? cache un  $A$  ou un  $B$  selon le résultat de la partie ajoutée au tournoi.

De façon générale, on dira que le tableau est *gagnant* s'il correspond à un tournoi gagné par l'équipe  $A$ .

- 7) Dans cette question, on suppose que  $m = 2$ . Indiquer les formes possibles de tous les tableaux gagnants et montrer que, pour tout entier  $n \geq 1$ , il y a exactement  $2^n + n2^{n-1}$  tableaux gagnants.
- 8) Dans cette question, on suppose toujours que  $m = 2$ .

- a) On note  $D$  le produit de tous les nombres  $(a_1 + b_j)(a_2 + b_j)$  lorsque  $j$  décrit  $\{1; 2; \dots; n\}$ . Ainsi, on a  $D = (a_1 + b_1) \cdots (a_1 + b_n) \times (a_2 + b_1) \cdots (a_2 + b_n)$ . On pourra noter  $D = \prod_{j=1}^n (a_1 + b_j)(a_2 + b_j)$ .

On considère un tableau  $T$ , gagnant ou non. Pour ce tableau, on note respectivement  $x_1$  et  $x_2$  le nombre de parties gagnées par  $A_1$  et par  $A_2$ . Pour tout  $j$ , on note  $y_j$  le nombre de parties gagnées par  $B_j$ .

Enfin, on organise un tournoi entre les équipes  $A$  et  $B$ , et on note  $\mathbf{P}_T$  la probabilité que les résultats des  $mn$  parties effectuées donnent le tableau  $T$ .

Exprimer  $\mathbf{P}_T$  en fonction des nombres  $D, a_1, a_2, x_1, x_2, b_1, b_2, \dots, b_n, y_1, y_2, \dots, y_n$ .

- b) On suppose maintenant que  $T$  est un tableau gagnant. On note  $k$  le nombre de colonnes 

$A$
$B$

de  $T$  et  $\ell$  son nombre de colonnes 

$B$
$A$

.

- i) Justifier que  $T$  ne contient aucune colonne 

$B$
$B$

 et qu'aucune colonne 

$A$
$B$

 n'est à droite d'une colonne 

$B$
$A$

.

- ii) On note  $T'$  le tableau obtenu à partir de  $T$  de la façon suivante :

▷ On conserve les colonnes 

$A$
$A$

 et on les laisse à leur place.

▷ On remplace les  $k$  colonnes 

$A$
$B$

 et  $\ell$  colonnes 

$B$
$A$

 de  $T$  par  $\ell$  colonnes 

$A$
$B$

 suivies de  $k$  colonnes 

$B$
$A$

.

Démontrer que  $T'$  est un tableau gagnant.

Qu'obtient-on si l'on effectue la même transformation à partir de  $T'$  ?

- c) Démontrer que la probabilité que l'équipe  $A$  gagne le tournoi ne dépend pas de l'ordre choisi des joueurs de l'équipe  $A$  pour leur entrée dans le tournoi.
- 9) On revient au cas général ( $m$  quelconque). Démontrer que la probabilité que l'équipe  $A$  gagne le tournoi ne dépend pas de l'ordre choisi des joueurs pour leur entrée dans le tournoi.